

# COVID-19 疫苗接種時間表 適用於18歲及以上的成年人

## 輝瑞 COVID-19 疫苗

初始劑量


加強劑量



## 莫德納 COVID-19 疫苗

初始劑量

加強劑量



## 強生 (J&J) COVID-19 疫苗

初始劑量

加強劑量



- 相較於強生疫苗，輝瑞和莫德納為較佳選擇（COVID-19 mRNA疫苗）。在某些情況下，你可以接種強生疫苗。
- 如果你患有COVID-19，請等到你康復後（如果你出現症狀）並且你的隔離期結束，再接種COVID-19疫苗。
- 有關更多資訊，請參閱[如何接種疫苗](#)網頁上的「我需要接種哪些疫苗？——適用於18歲及以上個人的資訊」。
- \* 接種第二劑疫苗的時機。對於大多數人而言，間隔8週可能是最好的。對於65歲以上或需要快速保護的個人而言，建議間隔3週。詳見[第2劑輝瑞或莫德納疫苗的接種時機](#)。
- \*\* 莫德納的接種劑量不相同。加強劑的接種劑量是正常劑量的一半。初始疫苗劑量為正常劑量。

免疫系統薄弱者的疫苗接種時間表請參閱[第3頁](#)。  
已全劑量接種非FDA授權/批准的疫苗的个人請參閱[第4頁](#)。


# COVID-19 疫苗接種時間表 適用於5-17歲的兒童

## 輝瑞 COVID-19 疫苗 - 適用於5-11歲的兒童



正常接種劑量的1/3

### 初始劑量



### 加強劑量

目前還沒有適合這個年齡組可建議或授權接種的加強劑疫苗

## 輝瑞 COVID-19 疫苗 - 適用於12-17歲的青少年



正常劑量

### 初始劑量



### 加強劑量

至少5個月

僅可接種輝瑞疫苗

- 適用於5-11歲兒童的輝瑞疫苗的活性成分與成人接種的疫苗相同，但劑量較小（為青少年和成年人接種的劑量的1/3）。12-17歲的青少年接種的輝瑞疫苗與成年人相同。
- 輝瑞公司的COVID-19疫苗是唯一獲得授權給18歲以下人群使用的疫苗。
- 如果你患有COVID-19，請等到你從疾病中康復後（如果你出現症狀）並且你的隔離期結束，再接種COVID-19疫苗。
- 有關更多資訊，請參閱[如何接種疫苗](#)網頁上的「我需要接種哪些疫苗？——適用於5-17歲的個人的資訊」。
- \* 接種第二劑疫苗的時機。對於大多數人而言，間隔8週可能是最好的。對於需要更快速保護的個人而言，建議間隔3週。詳見[第2劑輝瑞或莫德納疫苗的接種時機](#)。

免疫系統薄弱者的疫苗接種時間表請參閱[第3頁](#)。  
已全劑量接種非FDA授權/批准的疫苗的个人請參閱[第4頁](#)。

# COVID-19 疫苗接種時間表 適用於免疫系統薄弱者

## 輝瑞 COVID-19 疫苗 - 適用於5-11歲的兒童

初始劑量

加強劑量




目前還沒有適合這個年齡組可建議或授權接種的加強劑疫苗

## 輝瑞 COVID-19 疫苗 - 適用於12歲及以上的個人

初始劑量

加強劑量



12至17歲的個人僅可接種輝瑞疫苗  
18歲以上的個人可接種任何一種COVID-19疫苗  
(首選輝瑞或莫德納\*)。

## 莫德納 COVID-19 疫苗 - 適用於18歲及以上的個人

初始劑量

加強劑量



任意一種 COVID-19 疫苗  
(首選輝瑞或莫德納\*)。

## 強生 (J&J) COVID-19 疫苗 - 適用於18歲及以上的個人

初始劑量

額外劑量

加強劑量



任意一種 COVID-19 疫苗  
(首選輝瑞或莫德納\*)。


- 5歲及以上的**免疫系統中度或嚴重削弱**的個人(例如, 血液相關癌症或接受某些癌症治療、接受器官移植以及患有某些自身免疫性疾病)應額外接種一劑初始劑量疫苗。如果個人在12歲及以上, 他們也應該接種加強劑量疫苗。此外, 一種名為Evusheld的預防藥物已被推薦給12歲以上有這些身體狀況的個人。請查看[藥物](#)網頁, 並諮詢你的醫生。
- 如果你患有COVID-19, 請等到你從疾病中康復(如果你出現症狀)並且你的隔離期結束, 再接種COVID-19疫苗。
- 有關更多資訊, 請參閱[如何接種疫苗](#)網頁上的「我需要接種哪些疫苗? ——適用於免疫系統薄弱者的資訊」。

\* 莫德納的接種劑量不相同。加強劑的接種劑量是正常劑量的一半。初始疫苗劑量/額外劑量為正常的劑量。

# COVID-19 疫苗接種時間表

## 在美國以外的地區、在臨床試驗中、或接種了混合搭配疫苗的已全劑量接種COVID-19系列疫苗的個人可接種的加強/額外劑量

被認為已全劑量接種非FDA批准/授權的COVID-19疫苗初始劑量的個人應遵循以下加強劑和/或額外劑的COVID-19疫苗的接種時間表。已全劑量接種疫苗的定義請參見注釋。



- 在滿足以下條件後，你會被視為已全劑量接種疫苗：
  - 已接種世界衛生組織(WHO)[列為緊急使用](#)的疫苗系列的最後一劑。目前，此類疫苗包括阿斯利康-牛津(AstraZeneca-Oxford)的疫苗(Vaxzevria)、印度血清研究所私營有限責任公司(Serum Institute of India Pvt. Ltd)的疫苗(Covishield和Covovax)、BIBP國藥集團(Sinopharm)疫苗、科興生物(Sinovac)的疫苗(Corona Vac)、巴拉特生物技術公司(Bharat Biotech International)的疫苗(Covaxin)以及Novavax的疫苗(Nuvaxovid)。請參閱當前的[COVID-19 WHO EUL 列表](#)。
  - 已接種由FDA批准/授權和/或WHO列出的疫苗「混合搭配」的疫苗系列的最後一劑（僅在前兩劑間隔至少17天的情況下）。
  - 在臨床疫苗試驗中，接種了所有建議的「活性」COVID-19疫苗（不是安慰劑）。注意：此類COVID-19疫苗應該是未經美國食品和藥物管理局(FDA)批准/授權但由世界衛生組織列出的疫苗，或者是美國資料和安全監測委員會或同等機構獨立[證實其有效性](#)的疫苗。
- 如果你不符合已全劑量接種疫苗的要求，請參閱CDC的在美國以外/臨床試驗中接種的疫苗[附錄E和F](#)。
- 輝瑞和莫德納 COVID-19疫苗是唯一獲准作為未接種FDA授權/批准的COVID-19初始疫苗的個人接種的額外劑量或加強劑量的疫苗。
- 如果你曾患有COVID-19，請等到你康復後（如果你出現症狀）並且你的隔離期結束，再接種COVID-19疫苗或你的下一劑疫苗。
- 欲瞭解更多資訊，請參見網頁「[當你已全劑量接種疫苗後](#)」的「[我何時可算作已滿足最新的COVID-19疫苗接種要求?](#)」部分。
- \* 莫德納加強劑的劑量是正常疫苗劑量的一半。